SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 567 /BC-TT&BVTV

Nghệ An, ngày 05 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra tình hình sản xuất và sâu, bệnh hại trên cây dứa

Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình sinh trưởng và sinh vật gây hại trên cây trồng. Trong thời kỳ từ 28/10/2026 – 04/11/2026 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất, sâu, bệnh và công tác phòng trừ trên cây dứa tại một số địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra và thực tế đồng ruộng cho thấy:

1. Về kết quả sản xuất và tình hình sinh trưởng phát triển của cây dứa

Tính đến ngày 04/11/2026 toàn tỉnh đã trồng trên 3.055 ha dứa, tập trung tại các xã như: Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam, Giai Xuân, Bình Minh,... Hiện tại nhìn chung các diện tích dứa sinh trưởng phát triển tốt, những diện tích trồng từ cuối năm 2025, đầu năm 2026 đã xử lý đang ra hoa, quả non, các diện tích trồng năm 2026 đang được bó lá để điều chỉnh sinh trưởng hoặc chuẩn bị xử lý ra hoa.

2. Tình hình sâu, bệnh hại dứa

- Nhóm bệnh không truyền nhiễm (bệnh sinh lý): Qua kiểm tra cho thấy hiện nay trên đồng ruộng xuất hiện 02 bệnh không truyền nhiễm đang phát sinh gây hại cục bộ trên một số ruộng dứa gồm: Vàng đỏ lá và nứt cuống quả. Cụ thể:

+ Về bệnh vàng lá: Xuất hiện gây hại cục bộ trên một số diện tích dứa. Nguyên nhân chủ yếu, bộ rễ phát triển kém, đất khô, chai cứng làm ảnh hưởng đến khả năng hút nước và dinh dưỡng của cây dứa. Những diện tích bị vàng lá sẽ phục hồi trong quá trình bón phân, chăm sóc.

+ Về bệnh nứt cuống quả: Xuất hiện cục bộ trên một số ít diện tích ra quả non. Tỷ lệ cây bị hại phổ biến thấp dưới 2%. Nhận định nguyên nhân gây ra nứt cuống là do sau một thời gian nắng hạn dài, nông dân bón thúc và phun phân bón để xử lý ra hoa gặp mưa lớn, kéo dài cây sinh trưởng nhanh, hút nước nhiều và đột ngột dẫn đến nứt, bể cuống quả.

- Bệnh thối nõn hại dứa: Bệnh thối nõn đã phát sinh gây hại trên một số diện tích dứa MD2, Queen tại các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng,.... Tổng diện tích nhiễm bệnh khoảng 70 ha, chủ yếu trên diện tích dứa sau xử lý ra hoa trở đi với tỷ lệ cây bị hại phổ biến 1–2%, nơi cao 3–5%, cá biệt có ruộng 7-10%. Trên diện tích phát hiện bệnh nông dân đã và đang tích cực thực hiện phòng trừ.

3. Dự báo thời gian tới

- Hiện tượng lá vàng, nứt cuống quả tiếp tục gây hại song ở mức độ thấp, phạm vi gây hại cục bộ trên diện hẹp.

- Bệnh thối nõn dứa: Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa nhiều, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh, lây lan nhanh và gây hại nặng trên diện rộng nếu không được phát hiện, phòng trừ kịp thời.

.

4. Giải pháp quản lý

- Ngày 05/11/2026, Chi cục đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về các biện pháp tổ chức theo dõi, phát hiện và biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh thối nõn hại dứa.

- Chi cục tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Công ty CPTPXK Đồng Giao, Công ty CP NAFOOD Group để hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, nông dân phòng trừ bệnh.

- Đối với nứt bẻ cuống quả: Trên những diện tích đã xử lý ra hoa trở đi cần quản lý nước ổn định (nếu có điều kiện chủ động tưới tiêu) hạn chế để dứa gặp điều kiện khô hạn kéo dài sau đó gặp mưa lớn. Bón phân cân đối, bổ sung phân bón Canxi, Bo để làm chắc thành tế bào cuống quả, hạn chế hiện tượng nứt, bẻ cuống.

- Đối với bệnh thối nõn: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, nông dân chủ động phòng, trừ bệnh. Cụ thể:

Trên các diện tích phát hiện có bệnh gây hại cần tập trung khoanh vùng và tổ chức chỉ đạo phòng, trừ ngay bằng các biện pháp:

+ Thu gom cây bị bệnh, đưa ra khỏi vườn để tiêu hủy; xử lý hố cây bằng vôi bột để tiêu độc, khử trùng; chủ động tiêu thoát nước tốt trên ruộng dứa khi gặp mưa lớn.

+ Sử dụng một số loại thuốc có hoạt Phosphorous acid, Metalaxyl + Mancozeb, Fluopicolide + Fosetyl-alumilium, Dimethomorth, Fosetyl-aluminium; ... (Tên thương phẩm như thuốc Ridomil Gold 68 WG, Profiler 711.1WG, Acrobat MZ 600WP, Mataxyl 500WG, Ricide 72 WP, Aliette 800WG; Agri-fos 400SL;...) để phun trừ ngay. Trường hợp bệnh nặng, điều kiện thời tiết thuận lợi cần phun lại lần 2 sau 7-10 ngày.

- Trên những diện tích chưa phát hiện bệnh gây hại:

+ Khơi thông rãnh, mương; chủ động tiêu thoát nước, không để nước đọng kéo dài trong ruộng dứa, nhất là sau các đợt mưa lớn.

- Chỉ đạo chăm sóc đúng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật. Thực hiện phun phòng bệnh khi có áp lực bệnh cao hoặc gặp điều kiện mưa, ẩm thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển bằng các loại thuốc như: Aliette 800WG; Agri-fos 400SL, Profiler 711.1WG, Acrobat MZ 600WP, Mataxyl 500WG,...

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sản xuất và sâu, bệnh hại trên cây dứa. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xin báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết và có chủ trương chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Sở NNMT (để báo cáo);
- Phó chi cục trưởng (để biết);
- Lưu VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG T. NGHỆ AN

Nguyễn Tiến Đức