

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT**

Số: /TT&BVTV-BVTV

V/v tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu
cuốn lá nhỏ; sâu đục thân; rầy nâu, rầy lưng
trắng hại lúa vụ Hè thu - Mùa 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Vụ Hè thu – Mùa năm 2025, đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 68.000 ha lúa, hiện tại trà lúa Hè thu đang ở thời kỳ đẻ nhánh – làm đồng, lúa Mùa đang thời kỳ gieo, cấy nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian qua sâu cuốn lá nhỏ (lúa 4); rầy nâu, rầy lưng trắng lúa và sâu đục thân bướm cú mèo đã phát sinh gây hại trên một số diện tích lúa Hè thu giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng, toàn tỉnh có trên 480 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, 95 ha nhiễm rầy và 50 ha nhiễm sâu đục thân cú mèo. Hiện nay sâu non cuốn lá nhỏ lúa 4 trên trà lúa Hè thu giai đoạn cuối đẻ nhánh- làm đồng đang chủ yếu ở tuổi 5 – Nhộng và Trưởng thành, trên trà đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ đang giai đoạn chủ yếu tuổi 4, 5 và nhộng; sâu đục thân bướm cú mèo đang ở giai đoạn tuổi 4, 5.

Dự báo thời gian tới trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 4 sẽ vũ hóa rộ, sâu non tuổi 1 – 2 lúa 5 sẽ ra rộ kéo dài từ ngày 8 – 18/7 và có khả năng phát sinh mật độ cao, trên diện rộng. Sâu đục thân bướm cú mèo; rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ tiếp tục phát sinh gây hại, một số vùng sẽ có mật độ cao và gây hại nặng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ kịp thời, hiệu quả hạn chế tối đa thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lúa 5, sâu đục thân bướm cú mèo và rầy gây ra đối với sản xuất lúa vụ Hè thu - Mùa năm 2025. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tập trung phân công, chỉ đạo cán bộ phụ trách vùng bám sát đồng ruộng để phân trà, điều tra, phát hiện, dự tính dự báo kịp thời những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cao; tham mưu biện pháp kỹ thuật phòng trừ cụ thể cho UBND cấp xã, đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan trên địa bàn để tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, nông dân phòng trừ hiệu quả. Cụ thể:

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Không khuyến cáo nông dân phun phòng sau khi thấy bướm rộ. Chỉ khuyến cáo, hướng dẫn phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu non cao từ 30 con/m² trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất: Isocycloseram (Incipio® 200SC,...), Indoxacarb (Ammate 150SC, Clever 150 SC, 300 WG, Sunset 150SC, 300WG, Obaone 95WG,...), Chlorantraniliprole (Prevathon® 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Lufenuron (Match

50 EC,...), Emamectin benzoate (Angun 5 WG, Kajio 5WG, Bạch Hồ 150SC, Dylan 2EC, 10 WG,...),... phun theo liều lượng khuyến cáo. Thời gian phun hiệu quả nhất khi đa số sâu ở tuổi 1 – 3.

+ Đối với sâu đục thân: Giám sát chặt chẽ đồng ruộng, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun trừ sớm trên những diện tích có mật độ ổ trứng cao (từ 0,5 ổ trứng/m² trở lên đối với lúa ở thời kỳ đẻ nhánh và 0,3 ổ trứng/m² trở lên lúa ở thời kỳ làm đòng trở đi) bằng các loại thuốc các loại thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole (Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Cartap (Padan 95SP, Patox 95SP,...) phun theo liều lượng khuyến cáo (nếu mật độ ổ trứng cao > 0,5 ổ/m² cần phun 2 lần cách nhau 5 ngày).

+ Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Chỉ khuyến cáo phun trừ trên các diện tích có mật độ từ 1.000 con/m² trở lên bằng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Pymetrozine (Chess 50WG, Titan 600WG ...); Dinotefuran (Oshin 20WP,...); Acetamiprid+ Imidacloprid (Sutin 50SC,...); Clothianidin (Dantotsu 16WSG); Thiamethoxam (Actara 25 WG,...);... để phun trừ theo liều khuyến cáo. Đây là các thuốc có tác dụng lưu dẫn nên cần phun sớm khi rầy ở tuổi nhỏ. Trường hợp mật độ rầy cao, rầy trưởng thành nhiều cần hỗn hợp thuốc có tác dụng nội hấp trên với thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Dimethoate + Cypermethrin (Diditox 40EC,...); Fenobucarb (Bassa 50EC,...); Nitenpyram (Elsin 10 EC,...); ... để phun trừ. Khi phun đảm bảo đủ lượng nước thuốc (20 – 25 lít/500m²), phun ướt đều vào phần thân, lá lúa.

- Tăng cường kiểm tra việc khuyến cáo, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhận được công văn này, đề nghị UBND các xã, phường, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (để báo cáo);
- Trung tâm TT&BVTV vùng khu 4 (để báo cáo);
- Chi cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phan Duy Hải