

Số: /SNNMT-TT&BVTV
V/v tập trung theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu,
bệnh hại dưa, lúa vụ Hè thu-Mùa 2026

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay toàn tỉnh đã trồng trên 2.000 ha dưa, 68.100 ha lúa. Hiện nay trên dưa sâu non bọ hung (sùng) đã xuất hiện hiện gây hại cục bộ trên một số ruộng dưa trồng mới tại xã Giai Xuân với tỷ lệ cây bị hại 2- 3%, bệnh thối nõn dưa xuất hiện rải rác trên một số diện tích dưa tại các xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam,... Trên lúa các đối tượng như bệnh lem lép hạt, nhện gié đang phát sinh gây hại và có xu hướng gia tăng trên một số diện tích lúa vụ Hè thu giai đoạn làm đồng - trổ.

Dự báo trong thời gian tới sâu non bọ hung tiếp tục gây hại cục bộ trên một số diện tích dưa, đặc biệt Nghệ An đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến khó lường, có thể xảy ra nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng, ẩm độ cao,... rất thuận lợi cho bệnh thối nõn hại dưa; nhện gié, bệnh lem lép hạt hại lúa phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu, bệnh gây ra đối với sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị chuyên môn thuộc Sở, các địa phương khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường

- Tập trung phân công, chỉ đạo cán bộ bám sát đồng ruộng để điều tra, phát hiện, kịp thời khoanh vùng những diện tích có nguy cơ bị sâu, bệnh gây hại nặng để tổ chức chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả, nhất thiết không để sâu, bệnh lây lan gây hại nặng trên diện rộng. Cụ thể:

- Đối với bệnh thối nõn dưa:

+ Trước khi trồng: Vệ sinh sạch tàn dư cây trồng vụ trước, bón vôi để khử trùng và cải tạo đất trước khi trồng. Lựa chọn sử dụng chồi giống khỏe, sạch bệnh, trồng với mật độ thích hợp, không trồng quá dày; bón phân cân đối hợp lý, chú trọng bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh và quản lý nước, tạo rãnh để thoát nước tốt trong mùa mưa. Xử lý chồi giống trước trồng bằng cách nhúng chồi dưa vào dung dịch nước thuốc Aliette 80 WP ở nồng độ 0,2%; Agri-fos 400 SL ở nồng độ 1% hoặc Profiler 711.1WG ở nồng độ 0,2% trong 7 - 10 phút trước khi đem trồng.

+ Sau trồng: Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện bệnh sớm (đặc biệt từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau), phát hiện thu gom cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn dưa đốt tiêu hủy đồng thời bón vôi bột tiêu độc khử trùng vào hố cây đã nhổ bỏ. Chủ động phun phòng bệnh trước mùa mưa bằng các thuốc có hoạt chất như: Fosetyl-aluminium; Phosphorous acid, Metalaxyl + Mancozeb, Fluopicolide + Fosetyl-alumilium, Dimethomorph,... (Tên thương phẩm như thuốc Aliette 800WG; Agri-fos 400SL; Ridomil Gold 68 WG, Ricide 72 WP, Profiler 711.1WG, Acrobat MZ 600WP,...) theo liều lượng khuyến cáo. Trên những diện tích đã xuất hiện bệnh sử dụng các thuốc có hoạt chất như: Phosphorous acid, Metalaxyl + Mancozeb, Dimethomorph,... (tên thương

phần Agri-fos 400SL; Ridomil Gold 68 WG, Ricide 72 WP, Acrobat MZ 600WP,...) phun phòng trừ ngay theo liều lượng khuyến cáo để ngăn ngừa và hạn chế bệnh lây lan.

- Đối với bộ hung hại dừa: Khi phát hiện bộ hung gây hại cần áp dụng biện pháp thủ công để đào bắt và tiêu diệt sâu non hoặc sử dụng thuốc chứa hoạt chất như: Thiosultap-sodium (Neretox 95WP, Netoxin 90WP, Sát trùng đơn 5 GR,...), Cartap (Padan 95SP, Patox 4GR,...),... rải hoặc tưới vào gốc cây để diệt trừ sâu non.

- Đối với nhện gié hại lúa: Khi phát hiện những diện tích có tỷ lệ 5 - 7% số danh bị hại trở lên, lúa ở giai đoạn ôm đòng đến trổ cần tổ chức phòng trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Hexythiazox (Nissorun 5EC,...); Fenitrothion (Danitol 50EC,...), Propargite (Comite 750EW,...),... theo liều lượng khuyến cáo, trường hợp tỷ lệ nhện hại cao cần phải phun lại lần 2 sau 5 – 7 ngày. Khi phun cần chú ý tăng lượng nước thuốc để phun ướt đều phần thân và bẹ lá lúa.

+ Đối với bệnh lem lép hạt: Trong thời gian lúa bắt đầu trổ đến trổ hoàn toàn nếu có nguy cơ gặp điều kiện thời tiết mưa kéo dài, ẩm độ cao,... nhất thiết phải tổ chức phun phòng bệnh ngay bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Difenoconazole + Propiconazole (Tilt super 300ND, Still Liver 300ME, Scooter 300EC,...); Propiconazole (Tiptop Gold 400 EC, Tilt 250 EC,...); Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325 SC, Anthuc Top 480SC,...); Tebuconazole + Trifloxystrobin (Nativo 750WG, Conabin 750 WG,...),.... Thời điểm phun thuốc: Phun khi lúa bắt đầu trổ và phun lại lần 2 khi lúa đã trổ hoàn toàn nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển.

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Phân công lãnh đạo Chi cục phụ trách chỉ đạo tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ bị sâu, bệnh gây hại nặng. Thường xuyên phối hợp với các địa phương, ban, ngành liên quan trên địa bàn để tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả.

3. Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp:

Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở tập trung phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND xã, phường để tuyên truyền hướng dẫn, chỉ đạo người dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại.

4. Phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ:

Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có kế hoạch chỉ đạo và kịp thời đưa tin hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ trên hệ thống thông tin truyền hình, đài báo để nhân dân biết và thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Chi cục TT&BVTV (để thực hiện);
- Trung tâm Khuyến nông (để thực hiện);
- Trung tâm Giống nông nghiệp (để thực hiện);
- Phòng QLKT&KHCN (để thực hiện);
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thị Nhung