

2. Vệ sinh làm sạch

- ◆ Vệ sinh hàng ngày trong, ngoài chuồng nuôi, quét dọn, thu gom rác và chất thải. Rửa sạch chuồng trại, dụng cụ, bảo hộ lao động bằng nước với xà phòng hoặc chất tẩy rửa.
- ◆ Định kỳ 1 lần/tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi.

3. Sát trùng

- ◆ Sát trùng trong, ngoài chuồng nuôi, các thiết bị, dụng cụ, bảo hộ lao động trước khi đưa vào trại và sau khi sử dụng.



Phun sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi

- ◆ Sát trùng người và phương tiện



Tất cả các phương tiện phải thực hiện vệ sinh, sát trùng trước và sau khi ra, vào trại

- ◆ Xử lý phân và chất thải bằng biogas, chôn, đốt.



Đốt chất thải

Chôn chất thải

- ◆ Tiêu hủy xác lợn chết và sản phẩm từ lợn theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.
- ◆ Phòng bệnh bằng Vắc xin
- ◆ Thực hiện tiêm phòng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất cho từng đối tượng vật nuôi

III. BIỆN PHÁP CHỐNG BỆNH

1. Thực hiện tốt an toàn sinh học và “5 KHÔNG”

- ❌ **Không** giấu dịch (thông báo với chính quyền và cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn nghi mắc bệnh DTLCPP).
- ❌ **Không** mua, bán lợn bệnh, lợn chết.
- ❌ **Không** giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết.
- ❌ **Không** vứt lợn chết ra môi trường xung quanh.
- ❌ **Không** sử dụng thức ăn thừa chưa qua nấu chín làm thức ăn cho lợn.

2. Giám sát và cảnh báo dịch bệnh

Người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y, chính quyền địa phương.

3. Thực hiện công tác tiêu hủy lợn

- ✓ Thực hiện công tác tiêu hủy lợn khi có dịch Khi có dịch bệnh xảy ra, phải chấp hành tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương.
- ✓ Thực hiện kê khai, báo cáo với chính quyền địa phương đầy đủ đúng quy định.
- ✓ Cung cấp hồ sơ, chứng từ cho các cơ quan liên quan để được hỗ trợ (nếu có).



Tiêu hủy lợn mắc bệnh

BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

📍 Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
☎ (024) 3771 5294 - (024) 3771 1161
🌐 www.khuyennongvn.gov.vn

Hà Nội, 2024

I. ĐẶC ĐIỂM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

1. Đặc điểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, khi lợn bị bệnh, tỷ lệ chết cao, có thể lên đến 100%. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
- Vi rút Dịch tả lợn châu Phi có trong máu, cơ quan nội tạng, dịch bài tiết của lợn nhiễm bệnh. Lợn sau khi khỏi bệnh sẽ ở thể mãn tính có thể mang vi rút suốt đời.
- Vi rút có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56°C trong 70 phút hoặc ở 60°C trong 20 phút, trong máu lợn ở nhiệt độ 4°C trong 18 tháng.
- Vi rút miễn cảm với hầu hết các hóa chất và thuốc sát trùng thông thường như vôi, lotdine, chloroform, Virkon® S,...và xà phòng

2. Đường truyền lây bệnh

- Bệnh lây trực tiếp từ lợn ốm sang lợn khỏe.
- Bệnh lây gián tiếp do tiếp xúc với người, động vật, phương tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống, môi trường có mầm bệnh.



3. Triệu chứng bệnh

- Lợn sốt cao (40,5-42°C).
- Lợn bỏ ăn, lười vận động.
- Da tai, cẳng chân, phần dưới ngực và bụng đỏ sau đó xanh tím.
- Tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón.



Bệnh tích trên da lợn mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi

II. BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

Thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi gồm:

1. Cách ly, kiểm soát ra, vào cơ sở chăn nuôi:

- ✓ Chăn nuôi cùng vào - cùng ra.
- ✓ Kiểm soát con giống: con giống phải sạch bệnh, giống mới mua phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần (Chuồng cách ly) càng xa chuồng đang nuôi càng tốt.
- ✓ Cách ly khu vực chuồng nuôi với nơi ở của người và động vật khác (hàng rào, vách ngăn xung quanh, cửa ra vào có khóa, bố trí hố hoặc khay sát trùng,... Không nuôi các động vật khác như lợn rừng, gà, vịt, chó mèo,... trong khu vực nuôi lợn).



Sử dụng bảo hộ lao động và sát trùng trước khi vào khu vực chăn nuôi

- ✓ Kiểm soát chặt chẽ khách tham quan chuồng, trại, khu vực chăn nuôi.
- ✓ Sử dụng quần áo, ủng, bảo hộ lao động riêng cho khu vực chăn nuôi, vệ sinh sát trùng quần áo, dụng cụ bảo hộ trước và sau khi sử dụng.
- ✓ Diệt chuột và côn trùng gây hại
- ✓ Ngăn chặn chim, động vật hoang dã và thú nuôi khác vào khu vực chăn nuôi lợn.



Tiêu diệt ruồi, chuột, ngăn chó, mèo....vào khu vực chăn nuôi

- ✓ Cung cấp nước sạch (Nước máy hoặc nước giếng khoan qua lọc) dùng cho lợn.
- ✓ Kiểm soát nguồn thức ăn cho lợn ăn: Không cho lợn ăn thức ăn thừa của người khi chưa được nấu chín. Thức ăn hoặc nguyên liệu thức ăn đảm bảo chất lượng, không nhiễm mầm bệnh.